

Pour plus de
renseignements
demandez-nous conseil.



Clinique Vétérinaire des Gratte-ciel
Drs Maubant et Dunoguiez
135 Cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
04 78 84 46 70

Stérilisation de la chienne



Quelques rappels physiologiques

- Les chiennes sont pubères entre 6 mois et 1 an en moyenne (disparité selon les races).
- Elles ont en principe des chaleurs tous les 6 à 8 mois (en moyenne deux fois par an).
- Les chaleurs durent environ 3 semaines :
 - la première semaine, des pertes plus ou moins abondantes sont généralement visibles, la vulve est grosse et congestionnée.
 - la deuxième semaine correspond à l'entrée dans la période ovulatoire, c'est-à-dire à risques ; les pertes s'estompent, la chienne attire les mâles et accepte le chevauchement. Cette période est la plus propice à l'accouplement.
- Un à deux mois après les chaleurs, certaines chiennes peuvent présenter une " grossesse nerveuse " : elles grattent, cherchent leurs jouets, mangent moins, ont une lactation plus ou moins abondante. Ces troubles ne sont pas graves pour la santé de la chienne mais sont souvent gênants et répétitifs. Ils ne sont pas le signe d'un besoin de chiots mais d'un trouble hormonal fréquent et connu chez la seule chienne.
- La reproduction est un acte naturel mais il n'est pas indispensable à la bonne santé physique ou morale de la chienne.

La stérilisation

La stérilisation est une intervention qui a pour but d'empêcher la reproduction. Deux solutions définitives existent :

- **la ligature de trompes** : elle ne modifie en rien les cycles de la chienne, elle empêche simplement la gestation. Elle se fait par ouverture de la cavité abdominale. Elle présente moins d'intérêt que la seconde solution.

- **Povariectomie (ou ovariectomie)** : les ovaires (et l'utérus) sont enlevés par ouverture abdominale.

• Les avantages sont nombreux :

- La chienne ne présente plus de chaleurs ni de grossesse nerveuse.
- Les pathologies des ovaires et de l'utérus ne sont plus possibles.
- Lorsqu'elle est pratiquée avant la puberté, entre 6 et 8 mois, il est prouvé qu'elle diminue considérablement les risques de tumeurs mammaires.

• Les risques sont mesurés :

- Il est nécessaire d'être vigilant sur le poids des femelles stérilisées : les besoins alimentaires d'une chienne stérilisée sont moindres et il faut en tenir compte pour éviter

l'embonpoint, mais la prise de poids n'est pas une fatalité. Elle est plus fréquente sur des stérilisations tardives.

NB : quelques cas d'incontinence urinaire existent : ils sont rares. Ils sont dus à un manque d'hormones et sont traités très facilement par l'administration desdites hormones.

L'intervention chirurgicale proprement dite

La chienne doit nous être confiée une journée pour ce type d'intervention. Il convient de l'amener le matin même, à jeun pour éviter des risques de fausse déglutition pendant l'opération. Une anesthésie générale est nécessaire : la chienne est endormie par une injection, puis intubée et maintenue sous anesthésie gazeuse (avec apport permanent d'oxygène) pendant tout le temps nécessaire à l'intervention. L'ouverture de la cavité abdominale se fait par le milieu dans le sens longitudinal. Les ovaires sont trouvés, ligaturés et retirés. L'utérus peut être enlevé en même temps mais ce n'est pas obligatoire. La plaie est refermée par deux séries de points (musculaires puis cutanés). Le gaz anesthésique est ensuite stoppé et la chienne est maintenue sous oxygène jusqu'à son réveil. Elle sera gardée en observation jusqu'au soir afin de contrôler le bon réveil et l'absence de saignements ou d'autres complications.

Cette intervention est un acte de convenance : il s'effectue sur des animaux jeunes et en bonne santé. Les risques en sont donc limités mais ils ne sont pas nuls (comme tout acte chirurgical). Il convient de nous signaler tout trouble connu afin de n'opérer que des animaux en parfaite santé.

Conclusion

La stérilisation par ovariectomie présente de nombreux avantages, tant pour les maîtres que pour la chienne avec des risques mesurés et limités. Elle doit être pratiquée sur des chiennes jeunes, de préférence avant la puberté (plus d'avantages santé et moins de risques embonpoint).

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES